

Udredning for tuberkulose

Til patienter og pårørende

Denne information er til dig, der skal udredes for tuberkulose

Vær opmærksom på, at tuberkulose kan være i både aktiv og hvilende form. For yderligere information henviser vi til Danmarks Lungeforening.

I forbindelse med at du skal undersøges for tuberkulose, kan følgende undersøgelser være relevante.

Røntgen

Samtidig med indkaldelsen til Lunge Ambulatorium vil du blive indkaldt eller henvist til et røntgenbillede af dine lunger.

Der er ingen forberedelser til undersøgelsen.

Blodprøver

I forbindelse med besøget i Lunge Ambulatorium, vil du blive henvist til at få taget blodprøver. Der er ingen forberedelser til undersøgelsen.

Mantoux

Hvis du ikke er Calmette vaccineret, kan undersøgelsen omfatte en Tuberkulintest.

Testen er en lille injektion, der gives under huden på venstre underarm. Testen aflæses efter 72 timer.

Vær opmærksom på, at testen ikke kan gennemføres, hvis du har haft influenza eller andre febersygdomme indenfor de seneste dage, er MFR vaccineret for nylig eller har haft tidligere reaktion på mantoux-test eller andre injektioner.

Ekspektorater

I tilfælde af at du hoster slim op fra lungerne, kan det være relevant at sende prøver til analyse. Der er ingen forberedelse til undersøgelsen.

Ventrikelskyl

I tilfælde af mistanke om aktiv tuberkulose, hvor ingen af ovenstående undersøgelser har givet resultat, kan det være relevant at gennemføre en skylning fra mavesækken.

Yderligere information gives i tilfælde af, at undersøgelsen bliver aktuel.

Bronkoskopi

I tilfælde af mistanke om aktiv tuberkulose, hvor ingen af ovenstående undersøgelser har givet resultat, kan det være relevant at gennemføre en skylning fra lungerne.

Yderligere information gives i tilfælde af, at undersøgelsen bliver aktuel.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din udredning, kan du kontakte Lunge Ambulatorium.