

# Allopurinol

Til patienter og pårørende

## Anvendelse

Allopurinol anvendes for at sænke kroppens indhold af urinsyre, og kan hermed forebygge anfald af urinsyreigt.

## Virkning

I modsætning til de fleste dyr kan mennesker ikke udskille urinsyre særligt effektivt. Allopurinol gør, at vi udskiller urinsyre mere effektivt.

## Hvordan tages allopurinol?

Som regel begynder man med 100-300 mg per dag, kan øges yderligere hvis nødvendigt. Ved nedsat nyrefunktion, skal man gå forsigtigt frem. Allopurinol kan dog godt anvendes selv ved stærkt nedsat nyrefunktion.

## Bivirkninger

Generelt tåles allopurinol uproblematisk, i sjældne tilfælde ses alvorlige hudkomplikationer.

Almindelige bivirkninger: kvalme, diarre, hudkløe, hududslæt  
Sjældne bivirkninger: knoglemarvssuppression, overfølsomhed

## Allopurinol og andre mediciner

Samtidig behandling med visse hjertemediciner (ACE hæmmere ) som captopril og enalapril øger risikoen for overfølsomhedsreaktioner. Samtidig behandling med visse antibiotika (fx amoxicillin, ampicillin og mecillinam) øger risikoen for udslæt.

## Kontrol

Første gang 6-8 uger efter indsat behandling. Der skal tages blodprøver med urat (urinsyre) inden besøget.

## Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning

Allopurinol bør ikke anvendes.

## Allopurinol og alkohol

Generelt bør man være tilbageholdende med alkohol, hvis man har urinsyreigt.