

# Prøve (biopsi) fra spytkirtel

*Til patienter og pårørende*

## Hvorfor tage en prøve fra spytkirtlen (læbebiopsi)?

Som led i udredningen for mundtørhed og en type bindevævssygdom anbefales det ofte, at få taget en prøve af en spytkirtel. De nemmest tilgængelige spytkirtler befinder sig i mundslimhinden. Så her vil lægen typisk kunne finde nogle få og eventuelt forstørrede spytkirtler, der kan fjernes ved et lille indgreb i lokalbedøvelse og gennem et enkelt snit. Prøverne sendes så ind til yderligere vævsundersøgelse. Du får oftest mulighed for at komme hjem kort tid efter prøvetagningen.

Indgrebet varer ca. 1/2 time og foregår i lokal bedøvelse.

Sådan forbereder du dig til operation

## Blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin eller tager visse former for naturmedicin og/eller kosttilskud kan der være særlige forholdsregler i forbindelse med indgrebet. Vær opmærksom på, du har fået information/plan vedrørende din medicin.

## Er der ventetid?

Der er mange aktiviteter i gang på samme tid på en afdeling, og der kan derfor forekomme ventetid. Ventetiden kan for eksempel skyldes situationer med akut dårlige patienter.

## Hvordan forholder du dig efter operationen?

Såret er ca. 1 cm langt og er placeret på læbens inderside, så det ikke er synligt. Det er syet sammen med tråde, der opløser sig selv.

## Smerter og medicin

Efter en operation kan du have behov for smertestillende medicin. Vi anbefaler, at du sørger for at købe håndkøbsmedicin som fx Pinex, Panodil eller Pamol til når du udskrives. Husk at læse indlægssedlen.

## Kost

Du må spise normal kost, hvis ikke du er blevet oplyst om andet.

Udskrivelse - sådan forholder du dig

Du får information om forholdsregler af sundhedspersonalet.

## Ambulant

Lægen der har henvist dig får svaret på vævsprøven efter ca. 3 uger.

# Prøve (biopsi) fra spytkirtel

## Komplikationer

### **Betændelse:**

Hvis der opstår betændelse, skal du kontakte egen læge eller vagtlægen. Tegn på betændelse:

- Rødme omkring såret
- Udtalt hævelse
- Tiltagende smerter/ømhed

### **Hjemtransport**

Som udgangspunkt skal alle patienter selv sørge for transport og selv betale kørselsudgifterne. Der er dog nogle få undtagelser. Læs om transport og befordringsgodtgørelse på Esbjerg og Grindsted Sygehus' hjemmeside [www.esbjerggrindstedsygehus.dk](http://www.esbjerggrindstedsygehus.dk).

Spørg, hvis du er i tvivl

Øre-næse-hals Ambulatoriet

Tlf.: 7918 2783, se telefontider på vores hjemmeside

Med venlig hilsen

Personalet

Øre, Næse og Halsafdelingen