

Fjernelse af brystet og lymfeknuderne i armhulen

Til patienter og pårørende

Denne vejledning retter sig til dig, der skal have fjernet brystet pga. brystkræft og fjernelse af lymfeknuderne i armhulen.

Hvordan foregår operationen?

Operationen foretages i fuld bedøvelse.

Brystvævet fjernes gennem et snit i brystet, gående fra brystbenet til armhulen. Brystvorten fjernes også. Da vævsprøver har vist, at der er spredning til lymfeknuderne i armhulen, skal alle lymfeknuderne i den nederste del af armhulen fjernes. Dette gøres gennem det samme snit som brystfjernelsen. Såret bliver syet med selvopløselige sting, og der bliver evt. lagt et dræn.

Hvad er risikoen ved operationen?

Der kan opstå behandlingskrævende blødning eller betændelse i operationsfeltet. Der kan være forbigående eller permanent påvirket følesans omkring arrene, og i nogle tilfælde kan følesansen være nedsat i større dele af armhule og indersiden af overarmen. Arrene kan blive fortykkede og breddeøgede, og sætte sig fast ind mod brystmusklen. Ved forsinket sårheling og vævsdød kan man risikere, at efterbehandlingen bliver udskudt.

De fleste vil opleve, at der i løbet af nogle dage samler sig lymfevæske i hulrummet (serom). Dette er helt ufarligt, men hvis hævelsen bliver så stor at den generer, kan sygeplejerskerne i Brystkirurgisk ambulatorium tømme det ud med en tynd nål.

Hvis lymfeafløbet fra armen bliver påvirket af operation og strålebehandling, kan der opstå lymfødem, dvs. kronisk hævelse, af armen.

Forberedelse og forholdsregler før og efter din operation, samt kontaktinformation.

Se patientinformationen "Generel information om operation i brystet"

Venlig hilsen

Personalet i Brystkirurgisk ambulatorium