

Behandling med promethazin(Phenergan)

Phenergan anvendes som nødmedicin under et medicinsaneringsforløb.

Præparatet

Phenergan er et antihistamin, der sædvanligvis anvendes ved transportsyge, søvnløshed eller allergiske sygdomme, men kan også med fordel anvendes som nødmedicin under et medicinsaneringsforløb.

Virkningsmekanisme

Phenergan anvendes under medicinsaneringen på grund af den lettere sløvende effekt. Præparatet vil derfor ikke gøre dig smertefri under saneringsforløbet, men vil kunne få dig til at slappe af og falde i søvn, så det vil blive lettere at komme igennem de svære migræne- og hovedpineanfald.

Bivirkninger

Generelt tåles Phenergan godt efter de angivne dosisforslag og restriktioner og kan være en god hjælp og støtte til at komme igennem et medicinsaneringsforløb.

Phenergan har meget få bivirkninger, som er sløvhedsfornemmelse, træthed og mundtørhed.

Forsigtighedsregler

Vær opmærksom på, at alkohol, sovemedicin, stærk smertestillende medicin, anden allergimedisin og beroligende medicin forstærker den sløvende effekt af Phenergan. Ligeledes tilrådes forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner.

Hvilken dosis skal man tage

Phenergan anvendes i saneringsforløbet i stedet for smertestillende medicin og altid i forbindelse med hvile. Dosis vil være 25 mg (1 tablet) og kan gentages ved behov. Der skal dog gå minimum 2 timers mellem hver dosis, dog højst 75 mg per døgn.

Recepter

Recepter er elektroniske, og medicin kan derfor afhentes på alle apoteker i landet. Oftest kan der afhentes medicin flere gange på hver recept. Bed eventuelt apoteket om en udskrift af, hvilke recepter du har, og hvor mange udleveringer, der er på dem. Du kan også logge på Sundhed.dk, og under "medicinkortet" kan du se dine recepter. Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin ændre navn og udseende, men indholdsstoffet og virkningen vil være det samme.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk