

Operation for kort penisbånd og/eller sammenklæbning - børn og unge

Til patienter og pårørende

Hvad er forhudsfor snævring

I drengenes første leveår er det almindeligt, at for huden ikke kan trækkes tilbage.

Dette skyldes dels, at åbningen i for huden er for lille til, at den kan trækkes tilbage over penishovedet, dels ser man ofte små sammenvoksninger mellem for hudens inderside og penishovedet, der for hindrer, at for huden kan trækkes tilbage.

I løbet af de første leveår bliver for huden normalt mere løs, og hos mange drenge kan for huden efterhånden uden besvær trækkes tilbage. Generelt forventes en dreng at kunne trække for huden tilbage fra det fyldte 6. år.

Dog er der ingen regel uden undtagelser. Der er grund til korrektion, hvis der påvises et kort penisbånd, der tvinger penishovedet (glans) nedad, eller sammenklæbninger der medfører infektioner.

Operation for forhudsfor snævring

Operationen foregår i fuld bedøvelse hos børn.

Under operationen laver man enten en overskæring af penisbåndet eller blot løsning af sammenklæbningerne mellem indersiden af for huden og glans.

Operationen varer cirka 20- 30 minutter.

Efter operationen

- Der kan efter operationen være smerter og ømhed i operationsområdet, især ved vandladning. Det er helt normalt og forsvinder efter få dage. Det anbefales at I har anskaffet noget smertestillende håndkøbsmedicin som eksempelvis paracetamol, pinex eller pamol inden operationen, så det kan benyttes efter operationen. Børn må få smertestillende efter vægt op til 4 gange i døgnet.
- Huden omkring penis og pung kan efter operationen være hævet og misfarvet. Det er helt normalt og forsvinder i løbet af et par uger. Forsvinder hævelsen ikke, kommer der rødme omkring såret, varme og væske eller opstår der feber, skal du tage kontakt til din læge.
- Hold barnet i ro det første døgn
- Det er vigtigt at for huden trækkes tilbage 2 gange i døgnet, allerede fra dagen efter operationen for at forebygge tilbagefald.
- Skyl såret under rindende vand efter toiletbesøg
- Anvend stramsiddende underbukser de første dage og sørg for at penis placeres op ad maven.

Operation for kort penisbånd og/eller sammenklæbning - børn og unge

Tråde og kontrol

Sårene er syet med opløselige tråde, som forsvinder af sig selv.
Trådene kan dog klippes af på 8.- 10. dagen, hvilket giver et pænere ar.
Der er normalt ikke brug for kontrol

Sygemelding

1-2 dage