

Til patienter og pårørende

Valg af blodfortyndende medicin (AK-behandling)

Blodprop og Behandling
Klinisk Biokemisk Afsnit
Esbjerg Sygehus



Region Syddanmark

Marevan

Hvordan virker medicinen?

Hæmmer K-vitaminets virkning på stoffer i leveren, der igangsætter størkningsprocessen.

Indtages som tabletter.

Antal tabletter dagligt

Variere fra patient til patient. Afhænger af individuel INR-værdi.

Erfaring med medicinen?

Præparatet er velkendt. Har været anvendt i ca. 50 år.

Blodprøvekontrol ved behandlingen

Kræver løbende blodprøvekontrol, hvor behandlingen justeres i forhold til INR-værdien. Som regel hver 2-6. uge afhængig af patientens INR-værdi.

Hvis det skønnes af personalet, kan der være mulighed for oplæring af selvtest i hjemmet.

Modgift i forbindelse med akut operation eller blødning

I form af K-vitamin enten som tablet eller indsprøjtning. Virkningen indtræder i løbet af få timer.

Bivirkninger

Øget tendens til blødninger.

Færre blødninger i mavetarmkanalen i forhold til NOAK.

Hvordan er patienten beskyttet ved glemt dosis?

Virkningen af Marevan indtræder langsomt, men er i blodet ilang tid. Ved glemt døgndosis, er patienten derfor fortsat beskyttet mod blodpropper.

Kan sygdomme påvirke behandlingen?

Nogle sygdomme kan påvirke behandlingen med Marevan. Så der kan være behov for at tage blodprøver hyppigere end vanligt.

Kost og alkohols indvirkning

Kosten kan have betydning, hvis der indtages mange grønne grøntsager, da de indeholder K-vitamin, som virker modsat af Marevan.

1-2 genstande dagligt påvirker sjældent behandlingen.

Anden medicin, kosttilskud og naturlægemidlers indvirkning

Flere andre mediciner, nogle kosttilskud og naturlægemidler kan påvirke Marevanbehandlingen.

Prisen

Døgndosis er ca. 2-4 kr.

NOAK (Non vitamin K Orale AntiKoagulantia)

Hvordan virker medicinen?NOAK præparater (Xarelto, Eliquis, Lixiana og Pradaxa) hæmmer forskellige størkningsstoffer i blodet, og nedsætter derved blodets størkningsevne.Indtages som tabletter.**Antal** eller 2 tabletter indtages fast dagligt afhængig af præparat.**Erfaring med medicinen?**NOAK er et nyere præparat, som har været anvendt de sidste 10 år.**Blodprøvekontrol ved behandlingen**

Blodfortyndende effekt kontrolleres ikke ved hjælp af blodprøver ligesom Marevan.

Dosis afhænger af nyre- og leverfunktionen. Nyre- og levertal kontrolleres inden opstart, og efter 1 og 3 måneder. Herefter x2 årligt.

Modgift i forbindelse med akut operation eller blødning

Er under udvikling, erfaring savnes derfor.

Indtil vi har mere erfaring, pauseres behandlingen.

Bivirkninger

Øget tendens til blødninger.

Forsigtighed, især ved patienter, der har tendens til blødning i mavetarmkanalen. Lidt færre alvorlig blødning i hovedet i forhold til Marevan.

Hvordan er patienten beskyttet ved glemt dosis?

Virkning af NOAK indtræder hurtigt, men er også hurtigt ude af blodet igen. Ved glemt døgndosis er patienten dårligt beskyttet mod blodpropper.

Kan sygdomme påvirke behandlingen?

Ved svært nedsat lever- og nyrefunktion, hos patienter med mekaniske hjerteklapper samt antifosfolipid syndromkan NOAK ikke anvendes.

Kost og alkohols indvirkning

Ingen betydning.

1-2 genstande dagligt påvirker sjældent behandlingen.

Anden medicin, kosttilskud og naturlægemidlers indvirkning

Erfaring savnes.

Prisen

Døgndosis er ca. 22-24 kr.

Valg af blodfortyndende medicin (AK-behandling)

Kontakt

Blodprop og Behandling
Klinisk Biokemisk Afsnit
Esbjerg Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Telefon nr.: 7918 2634
Send sikker post via afdelingens hjemmeside

Materiale nr.: 173925-24.11.2022