

Fjernelse af Kønsvorter (Kondylomer)

Til patienter og pårørende

Fjernelse af kønsvorter ved laserbehandling

Hvordan foregår indgrebet?

Indgrebet foregår i fuld bedøvelse. Du sover og er smertefri under hele operationen. Med laserapparat sendes laserlys mod det væv, der skal behandles, hvorved forandringer fjernes.

Du vil blive forberedt til indgrebet i Kvindesygdomme Ambulatorium.

Her vil du få:

En lægesamtale og optaget journal.
En samtale med et plejepersonale om indlæggelsesforløbet.
Eventuelt en samtale med anæstesilægen om bedøvelse.
Eventuelt have taget blodprøver.

Komplikationer, der kan forekomme i forbindelse med indgrebet

Hos nogle kan der være træthed, hovedpine, kvalme eller opkastninger, som hurtigt forsvinder. Smerter/svie kan forekomme.

Fuld bedøvelse indebærer altid en vis, omend meget lille, risiko.

Ved problemer det første døgn: Kan du kontakte Planlagt Kirurgi på telefon 7918 3008.

Efter Planlagt Kirurgis lukketid kontaktes sygeplejersken i Fælles Akutmodtagelse (FAM) på telefon 7918 2269.

Hvor længe skal du være sygemeldt?

Såfremt der er behov for sygemelding ud over operationsdagen aftales dette.

Efter indgrebet

De første dage efter indgrebet kan der være lette smerter.
Du får udleveret smertestillende salve og kan desuden supplere med almindelig håndkøbsmedicin.
Kolde omslag kan også virke smertestillende.

Så længe der er sår, kan du tage daglige halebade/afvaskning med uparfumeret sæbe.
I den periode skal du undlade samleje.

Hvis du oplever manglende vandladning trods vandladningstrang skal du reagere

Behandlingen bør kontrolleres af egen læge ca. to uger efter indgrebet.

Får du i ugen efter indgrebet kraftige smerter eller feber, skal egen læge kontaktes.

Fjernelse af Kønsvorter (Kondylomer)

Du vil, såfremt det er nødvendigt, blive indkaldt til kontrol i Kvindesygdomme Ambulatorium efter 3 måneder.

Hjemtransport

Du skal selv sørge for hjemtransport.

Da du har været i fuld bedøvelse må du ikke selv køre bil eller lignende før dagen efter indgrebet.

Dette bør du vide om kondylomer

Kondylomer skyldes et virus, som overføres ved fysisk kontakt.

Der kan gå uger eller måneder fra smitte, til der kommer synlige kondylomer.

Som regel mærker du ikke noget, hvis du har kondylomer.

Det er en god ide at anvende kondom ved samleje, i hvert fald indtil du er sikker på, at alle kondylomer er væk. Generelt set anbefaler vi, at man altid vasker hænder efter man har rørt ved kondylomerne.

Hvis din partner har kondylomer, eller ikke er undersøgt herfor, bør vedkommende søge læge med henblik på dette.

Det er vigtigt, at begge parter bliver undersøgt og eventuelt behandlet.

Risikoen for følger efter en seksuelt overført infektion er mindre, hvis den bliver behandlet tidligt.

Tænk over, om der er flere partnere, som du kan have smittet eller selv kan være blevet smittet af.

Kontrol

I nogle tilfælde vil du blive inviteret ind til en kontrol 3 måneder efter din laserbehandling.

Dette aftales nærmere med den læge, der udfører indgrebet.

Med venlig hilsen

Personalet i Kvindesygdomme Ambulatorium