

Stivkrampe

Til patienter og pårørende

Du er på Skadeklinikken/Skadestuen blevet vaccineret mod enten:

- stivkrampe (VAT).
- stivkrampe-difteri (DiTe).
- eller er startet stivkrampevaccination, da du ikke er grundvaccineret (børnevaccineret) (VAT).

Hvad er stivkrampe - tetanus?

Det er en sygdom forårsaget af stivkrampebakterien, som tilføres kroppen gennem sår. Stivkrampebakterien producerer et kraftigt giftstof, som gradvist påvirker nervesystemet, hvilket medfører stivhed i musklerne. Det kan udvikle sig til en krampetilstand, som kan medføre døden. På grund af vaccinationen er dødeligheden herhjemme reduceret til næsten 0.

Derfor er det vigtigt at være vaccineret!

Hvad er difteri?

Det er en sygdom forårsaget af difteribakterien. Bakterien kan udvikle sig til halsbetændelse med belægnings og/eller strubehoste, der i værste fald kan være dødelig. Den kan også forårsage kredsløbsproblemer.

Hvordan får du difteri?

Smitten sker ved dråbeinfektion - hoste og tæt kontakt med personer, der er smittebærer.

Hvorfor vaccinere mod difteri?

Difteri er blevet mere udbredt de sidste år. En del lande grundvaccinerer ikke mod difteri og rejser til disse lande bringer smitten til Danmark.

Kort om difteri og stivkrampevaccination

Selve vaccinationen kan give dig rødme, ømhed og hævelse på indstiksstedet. Desuden kan du blive lidt utilpas med feber og hovedpine.

Hvornår skal du vaccineres?

Hvis der er gået mere end 5 år siden primær vaccination/børnevaccination.

Hvis der er gået mere end 10 år siden din sidste vaccination.

Hvis du aldrig er blevet vaccineret, eller dit sår er meget stort og forurennet, er det muligt, at du skal have en ekstra indsprøjtning. I de tilfælde vil personalet informere dig om hvorfor.

Med venlig hilsen

Sydvestjysk Sygehus