

Smertebehandling i forbindelse med operationer og behandlinger i LA og GA

Til patienter og pårørende

Ortopædkirurgisk Afdeling, EsbjergSygehus Grindsted Sygehus

I forbindelse med din operation eller behandling kan du få brug for efterfølgende smertebehandling.

Som udgangspunkt anbefaler vi, at du selv anskaffer tabl. Paracetamol 500. mg (sælges f.eks. som Pamol, Pinex, Panodil eller Pinemol) og evt. tabl. Ipreen 200 mg.

En grundlæggende smertebehandling for voksne består af Paracetamol 500 mg., 2 tabl. 3-4 gange dagligt, og evt. tabl. Ipreen 200 mg. 1-2 tabl. 2-4 gange dagligt.

Hvis vi ikke regner med, at smertebehandlingen med håndkøbsmedicin tager dine smerter, vil du enten få medicinen udleveret fra afdelingen, eller kunne hente medicinen på et apotek.

Hvis du oplever sviende fornemmelser i maven, sure opstød eller lignende, skal du stoppe med smertebehandlingen, og kontakte din egen læge.

Du er altid velkommen til at spørge personalet, hvis du er i tvivl.

Med venlig hilsen

Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus