

## Behandling med pregabalin (Lyrica)

Pregabalin anvendes til nervesmerter.

### Præparatet

Pregabalin anvendes til behandling af trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og andre nervesmerter.

Pregabalin anvendes desuden til behandling af epilepsi og angst.

### Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er svimmelhed, hovedpine, træthed og øget appetit.

### Forsigtighedsregler

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer. Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte. Behandling er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker.

Alkohol og lorazepam forstærker midlets sløvende virkning.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

### Virkningsmekanisme

Pregabalin virker ved at stabilisere nervecellerne.

### Hvilken dosis skal jeg tage

Startdosis er 75 mg 2 gange dagligt i 7 dage.

Herefter øges dosis til 150 mg 2 gange dagligt.

Tåler du pregabalin godt, kan du ved behov efter yderligere 1 uge øge til 300 mg 2 gange dagligt.

### Recepter

Recepter er elektroniske, og medicin kan derfor afhentes på alle apoteker i landet. Oftest kan der afhentes medicin flere gange på hver recept. Bed eventuelt apoteket om en udskrift af, hvilke recepter du har, og hvor mange udleveringer, der er på dem. Du kan også logge på Sundhed.dk, og under "medicinkortet" kan du se dine recepter. Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin ændre navn og udseende, men indholdsstoffet og virkningen vil være det samme.

### E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.