

Antibiotika med CADD pumpe

Til patienter og pårørende

Antibiotika i eget hjem med CADD pumpe

Lægen på sygehuset har vurderet at din behandling med antibiotika kan fortsætte i eget hjem. Det betyder for dig, at du kan komme hjem med et drop i blodåren, som er koblet til en lille transportabel pumpe, som giver dig medicinen i løbet af et døgn. Pumpen kan tages af, når sidste døgndosis er givet.

Det er lægerne på den udskrivende afdelingen, der har ansvaret for din behandling i hjemmet. Du skal derfor ikke rette kontakt til din praktiserende læge, men afdelingen du er udskrevet fra.

Hvad du skal være opmærksom på

For at beskytte dit drop, skal du være opmærksom på:

Hygiejne

Undgå at udføre ting, hvor du kan risikere, at der kommer snavs og urenheder i nærheden af droppet, som f.eks. havearbejde, rengøring, etc.

Bad

Pumpen må **ikke** blive våd. Du kan alternativt hænge pumpen på en knage udenfor brusekabinen eller lægge pumpen på gulvet udenfor brusekabinen, med et håndklæde om sig.

Du kan beskytte dit drop ved f.eks. at tage en plasticpose eller engangshandske henover droppet, så det ikke bliver vådt. Du må ikke gå i karbad eller svømmehallen, så længe du er i behandling med antibiotika i blodåren.

Forbinding

Plastret omkring dit drop skal skiftes, hvis det er løst, urent eller vådt. Ved PICC-line og CVK skal forbindingen skiftes hver 7. dag. Dette vil akutsygeplejersken varetage eller sygeplejersken på det udskrivende afsnit.

Hvis dit drop falder ud

Sæt et plaster henover åbningen, hvor droppet har siddet og hold indtil blødningen stopper. Hvis du er udskrevet med et akutteam kontakter du sygeplejerskerne på det udleverede nummer du har modtaget, ellers kontakter du sengeafsnittet du er udskrevet fra.

Hvis du mistænker at der løber væske i underhuden

Der kan komme en bule omkring droppet og det kan svide. Sluk for pumpen og kontakt det pågældende akutteam /sygeplejerske du er tilknyttet på det udleverede telefonnummer. Du kan til hver en tid rette henvendelse til Lugesygdommes sengeafsnit, såfremt du har generelle spørgsmål til pumpen, der ikke besvares i dette ark.

Antibiotika med CADD pumpe

Tegn på betændelse

Du skal være opmærksom på generelle tegn på infektion , der er:

- Rødme
- Varme
- Hævelse
- Smerter

Tal med akutsygeplejersken eller det udskrivende afsnit.

Hvor kan pumpen være, når jeg sover

Du kan have pumpen ved siden af dig i sengen, når du sover eller på natbordet, men du kan også have det liggende på gulvet i et rent klæde.

Hvis pumpen alarmerer

Ring til akutsygeplejersken på det udleverede nummer eller den udskrivende afdeling

Ved pludseligt ubehag

Hvis du oplever at blive utilpas, svimmelhed, udslæt på kroppen eller problemer med at trække vejret skal du **straks ringe 112. Oplys om dine symptomer og hvad du er blevet behandlet med**

Efter endt behandling

Det er patient / pårørendes ansvar at pumpen returneres til udskrivende afdeling efter endt behandling.

Kontakt oplysninger

Akutteam: _____

Udskrivende afdeling: _____

Tlf. alle dage: _____