

Salazaopyrin Entabs

Til patienter og pårørende

Salazaopyrin Entabs dæmper betændelsesreaktioner i leddene (smerter, varme, rødme, hævelse og stivhed) ved kronisk leddegigt, psoriasisgigt og reaktiv gigt.

Er et langsomt virkende gigtmiddel.

Virkningen indtræder som regel først efter 8-16 ugers behandling i fuld dosis. Ved fuld effekt vil ledsymptomerne aftage eller forsvinde.

Lægemidlet bruges som langtidsbehandling.

Virkningen kan aftage efter nogle år, men sammenlagt har ca. 65 % af patienterne god virkning af lægemidlet.

Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 1/2 år, vil man oftest ophøre behandlingen.

Salazopyrin Entabs kan kombineres med andre gigtmidler.

Brug

Salazopyrin Entabs skal synkes hele sammen med rigeligt væske og indtages bedst om morgenen og aftenen i forbindelse med et måltid.

Følg nøje lægens anvisninger om dosis og kontrol.

Start dosis er 1 Entabs (500 mg) dagligt den første uge.

Derefter øges dosis med 1 Entabs dagligt hver uge, således at man den 4. uge tager 2 Entabs (1 g.) 2 gange dagligt. Denne dosis fortsættes der med.

Der kan eventuelt senere øges til 3 Entabs (1,5 g.) 2 gange dagligt.

Bivirkninger

Ved korrekt brug er bivirkninger sjældne.

I starten kan tabletterne give kvalme eller smagsændring. Dette kan afhjælpes ved langsom øgning af dosis og kvalmen eller smagsændring svinder oftest ved fortsat brug.

Medicinen kan give udslæt og eventuelt feber, som kan være udtryk for overfølsomhed og behandlingen må standses. I så tilfælde kontaktes lægen. Lever, nyre og knoglemarv kan påvirkes. Ved pludselig fremkomst af hudblødninger (som røde/blå pletter, oftest på benene) skal lægen kontaktes. Ved mangel på hvide blodlegemer kan der komme tendens til infektioner, hvorfor lægen skal kontaktes ved feber, især halsbetændelse.

Stoffet er naturligt gult og kan derfor farve urin og bløde kontaktlinser gule.

Anden medicin og alkohol

Må ikke anvendes ved allergi overfor salisylater (f.eks. Magnyl og Aspirin) eller sulfonamider (Sulfa). Bør ikke anvendes ved stofskiftesygdommen porfyri. Optagelsen af Folsyre og Digoxin kan nedsættes. Man bør altid oplyse lægen om, hvilke andre lægemidler - naturmidler man benytter.

Der er ingen specielle restriktioner i forbindelse med indtagelse af alkohol.

Salazaopyrin Entabs

Prævention, graviditet og amning

Hos mænd kan antallet af sædceller midlertidigt mindskes og det kan være sværere at få børn. Dette er ufarligt og sædcelleantallet og frugtbarheden bliver normal når behandlingen standses.

Salazopyrin kan anvendes ved graviditet. Der kan være særlige forhold ved gigt og graviditet, hvorfor en drøftelse med lægen kan være en god idé.

Salazopyrin udskilles i modermælken, men der er ikke vist skadelig effekt hos det diende barn.

Kontrol

Kontrol af blodprøver 3 uger efter opstart, 6 uger efter opstart. Derefter hver 12. uge.

Regelmæssig blodprøvekontrol er nødvendig for at registrere forstadier til alvorlige bivirkninger, så som påvirkning af knoglemarv og lever.

Recepter skrives/fornyas i Gigt og Bindevæv Ambulatoriet.

Er du i tvivl om noget, så spørg lægen eller sygeplejersken.