

Før operation eller undersøgelse

Til patienter og pårørende

Når du skal bedøves til din operation eller undersøgelse

I forbindelse med bedøvelse

Som patient møder du til forundersøgelse hos kirurgerne. Her vurderer i sammen om du har brug for at komme til samtale hos en narkoselæge eller om vi kan lave et administrativt tilsyn og sende dig et brev.

Bedøvelsen bliver altid planlagt individuelt, så vi tager hensyn til lige præcis dig, indgrebet, din helbredstilstand og dine behov.

Du vil opleve, at vi bruger begreberne anæstesi, narkose og bedøvelse i flæng, men det dækker over det samme.

Bedøvelsen er afhængig af:

- Operationen/undersøgelsen
- Din generelle helbredstilstand
- Dine erfaringer med bedøvelse
- Den medicin, som du tager - husk en opdateret medicinliste
- Dine luftvejsforhold

Hvis der er uklarhed om andre sygdomme, der er vigtige i forhold til bedøvelsen, vil vi iværksætte relevante undersøgelser. Det kan, for din egen sikkerheds skyld, medføre at operationen/undersøgelsen må udskydes.

Før operation eller undersøgelse

Typers af bedøvelse

Vi kan bedøve dig på flere måder, og vi vil ofte kombinere det med en form for blokade i det omfang, det er muligt og nødvendigt. Det afhænger både af operationen/undersøgelsen og din helbredstilstand.

Du kan læse om de forskellige former for bedøvelse i nedenstående links fra sundhed.dk:

- [Fuld bedøvelse \(general anæstesi\)](#)
- [Rygbedøvelse med kateter \(epidural anæstesi\)](#)
- [Rygbedøvelse \(Spinal anæstesi\)](#)
- [Bedøvelse af nerver i f.eks. arm eller ben \(blokader/regionalbedøvelse\)](#)

Smertebehandling

Patienter føler sig mere trygge og mindre stressede med en god lindring af smerten. Vi sørger for, at du er godt smertedækket under din operation og i opvågningen. Kirurgerne har ordineret smertestillende til dig efter operationen, denne plan skal du følge. Hvis der er behov for supplerende smertestillende, i form af regionalbedøvelse og blokader eller andet, lægger vi en plan med dig og kirurgerne.

Rygning og alkohol

Til visse operationer kræver kirurgen ryge- og alkoholstop. Et alkoholforbrug på mere end 4 genstande dagligt øger risikoen for komplikationer som sårproblemer, infektioner, lungeproblemer og forlænget indlæggelsestid. Hvis dit forbrug er større end det maksimalt anbefalede fra Sundhedsstyrelsen, bør du helt stoppe med alkohol 4 uger før operationen.

Fasteregler

Vi anbefaler altid at [læse vores Fasteregler](#), for at undgå en uheldig situation hvor operation eller undersøgelse, må udskydes.

Før operation eller undersøgelse

Medicin

Du aftaler med narkoselægen, om du skal tage din vanlige medicin på dagen eller om du skal pausere din medicin. I tilfælde af administrativt tilsyn, sender vi dig et brev, når vi har læst din journal igennem med besked om medicinen.

- Sukkersyge (diabetes)

Hvis du har sukkersyge, skal du som regel ikke tage din medicin for din sukkersyge den dag, du skal opereres/undersøges.

Vi måler dit blodsukker jævnligt og giver hurtigtvirkende insulin ved behov. Nogle sukkersygepatienter får sukkerholdigt væske tilsat hurtigtvirkende insulin

- Blodfortyndende medicin

Der kan være særlige regler, hvis du får blodfortyndende medicin. Vær opmærksom på at du har fået præcis besked om netop din medicin.

- Beroligende medicin

Der er sjældent behov for beroligende medicin før operationen/ undersøgelsen. Erfaring viser, at god information og kommunikation beroliger bedre.

Tandskader ved bedøvelse

Det er vigtigt, at du oplyser os om din tandstatus, da der i sjældne tilfælde kan opstå tandskader under helbedøvelse. Patienter med skrøbelige tænder eller paradentose er særligt udsatte.

Skulle der ske en tandskade, selvom vi er omhyggelige, vil det blive meldt til patienterstatningen hvis skaden oversiger det lovpligtige egetbidrag.

Pårørende

Pårørende må som udgangspunkt ikke komme med på operationsstuen. Der kan dog være undtagelser. Du er altid velkommen til at spørge.

Før operation eller undersøgelse

Inden du møder på sygehuset til din operation eller undersøgelse

Af hensyn til din sikkerhed skal du fjerne følgende før du møder op:

- Alle smykker (gælder også øreringe og piercinger)

For at undgå trykmærker på huden og bakterier, der gemmer sig under smykker.

- Makeup

For at vi kan observere dit kredsløb og undgå kemisk irritation af dine øjne.

- Kontaktlinser

For at undgå risiko for læsioner af dine hornhinder.

- Briller, høreapparat og tandprotese

Du må gerne beholde briller, høreapparater og tandproteser indtil vi bedøver dig.

Briller, høreapparat og tandprotese

Du må gerne beholde briller, høreapparater og tandproteser indtil vi bedøver dig.

Bad før operation

For at undgå infektion skal bakterieantallet på huden være så lavt som muligt før operationen.

Det er derfor vigtigt, at vaske hele kroppen, uanset hvad, der skal opereres for.

Eventuel hårfjernelse vil ske på selve operationsdagen og kun efter anvisning.

Hele kroppen vaskes med almindelig sæbe aftenen før og/eller om morgenen før operationen.

Sådan gør du:

- Skyl først kroppen grundigt
- Vask håret almindeligt
- Vask ansigt, krop og navle med sæbe
- Særlig grundig vask af næse, armhuler og hænder, lyske, skridt, fødder og navle
- Skyl til sidst kroppen fri for sæbe
- Tør omhyggeligt kroppen med et rent håndklæde
- Tag rent tøj på

Vær opmærksom på

- At du ikke må anvende lotion eller creme på huden på operationsdagen
- At du skal rense neglene og klippe dem korte

Tøj

Vi renser huden i farvet sprit, det kan smitte af på dit tøj. Vær derfor opmærksom på hvilket tøj du tager på når du tager hjem fra sygehuset.