

Allergivaccination.

Til patienter og pårørende

Allergivaccination, patientinformation og dagbog



Vi kan tilbyde allergivaccination til:

- Børn med livstruende insektallergi (bi/hveps).
- Børn med allergi overfor birk, græs og husstøvmider, som på trods af intensiv behandling med øjendråber, næsespray og tabletter/mikstur har væsentlig nedsat livskvalitet i længere perioder om året.

OBS

Barnet skal være indforstået med at skulle have indsprøjtningerne og skal kunne holde armen stille under injektionerne.

Udgifter dækkes af sygehuset

Sådan foregår allergivaccinationen:

Allergivaccinationen består af:

1. Opdosering: mindst 13 uger, foregår i Børn og Unge Ambulatoriet.
2. Vedligeholdelse: 3-5 år, foregår i Børn og Unge Ambulatoriet eller hos din egen læge.

Opdosering

En gang om ugen får du en injektion i armen med det, du er allergisk overfor. Første gang gives 3 vaccinationer med 1/2 times mellemrum, efterfølgende gives kun 1 vaccination pr. gang. For hver gang bliver vaccinationen stærkere, indtil vedligeholdelsesdosis er nået (sædvanligvis efter 13-15 uger, afhængig af, hvordan du reagerer).

Vedligeholdelse

Ca. hver 6. uge får du en injektion i armen med en vedligeholdelsesdosis.

Inden hver allergivaccination

Du må ikke være syg 3 dage op til vaccinationen. Ring og aftal ny tid

Du må ikke have astma-/allergisymptomer eller peakflowfald. Ring og aftal ny tid

Du skal fortælle, om du har haft reaktioner på sidste vaccination

Du skal puste peakflow herinde før allergivaccinationen. (Medbring gerne eget peakflowmeter).

Du må ikke have fået andre vacciner indenfor en uge før og en uge efter vaccinationen.

Allergivaccination.

Efter hver allergivaccination

Der er hver gang en (meget lille) risiko for, at allergivaccinationen kan udløse kraftige allergisymptomer. Dette kan ske indenfor den første 1/2 time. Derfor skal du -både i Børn og Unge Ambulatoriet og hos egen læge - vente 1/2 time. Først når vi har set din arm, og du har pustet peakflow igen, må du forlade ambulatoriet. Skulle du få en kraftig reaktion, har vi medicin klar.

Efter allergivaccinationen skal du slappe af resten af dagen: Ingen aktiviteter, der giver øget blodcirkulation som f.eks. gymnastik, svømning, badminton, computerspil eller indtagelse af alkohol.

Du og dine forældre skal ringe straks, hvis du oplever en af følgende reaktioner på allergivaccinationen:

- Hævelser i ansigtet, i munden eller i halsen.
- Udslæt i ansigtet eller på kroppen.
- Hoste og åndenød eller pludseligt fald i peakflow.
- Kraftige nyseture og snue

Børneafdelingens tlf.nr.: **7918 3031**. Husk at oplyse om at du er blevet allergivaccineret, og hvornår sidste injektion er givet. Ring 112 ved voldsomme reaktioner.

Symptomregistrering hjemme (brug skemaet på næste side):

- Mål hævelsen på vaccinationsstedet ca 6 timer efter vaccinationen.
- Skriv målene ind i skemaet.
- Øges hævelsen efter 6 timer, noteres dette under Symptomer.
- Beskriv hvis du får symptomer efter vaccinationerne.
- Husk at notere hvornår symptomerne kom og forsvandt.

SKEMAET SKAL MEDBRINGES HVER GANG

Dato	Højre/venstre underarm cm x cm	Højre/venstre overarm cm x cm	Symptomer fra kl. til kl.		
			Høfeber	Astma	Udslæt