

Hjernetest ved leverbettinget hjernep avirkning

Til patienter og p ar rende

Hvad er leverbettinget hjernep avirkning?

Hvis du har skrumpelever, kan du fa leverbettinget hjernep avirkning (hepatisk encefalopati). Det skyldes, at leveren ikke kan rense blodbanen for giftstoffer, og de derfor p avirker hjernens funktion.

Hvorfor skal jeg unders ges for leverbettinget hjernep avirkning?

Cirka halvdelen af alle personer med kronisk leversygdom har en mild form for leverbettinget hjernep avirkning. Har du leversygdom, er der derfor god grund til at blive unders gt for leverbettinget hjernep avirkning i f lgende tilf ælde:

- Du eller dine p ar rende l gger m rke til, at noget er forandret. Det kan for eksempel v re, at du f ler dig mere tr et og ukoncentreret, har sv rt ved at holde styr p  dine daglige g rem l, er initiativl s og langsommere end s dvanligt.
- Du k rer ofte bil eller betjener maskineri.
- Du har for nylig v re indlagt med alvorlig hjernep avirkning (koma).
- Der er behov for at kontrollere effekten af den medicin, som du f r mod leverbettinget hjernep avirkning.

Holdes tilstanden under kontrol, vil du sandsynlighed opleve, at du fungerer bedre i dagligdagen og at indl ggelser med alvorlig hjernep avirkning kan forebygges.

Hvordan unders ges det, om jeg har leverbettinget hjernep avirkning?

Man kan kun opdage de mildeste former for leverbettinget hjernep avirkning ved at teste hjernens funktion. De test der bruges er:

- En test p  computer, som m ler din reaktionstid over en periode p  ti minutter. Under testen f r du h retelefoner p  og skal trykke, s  hurtigt du kan, p  en trykknop, n r du h rer en lyd i h retelefonerne.
- En test, der best r af fem sm  opgaver, som unders ger din arbejdshastighed og pr cision. Den udf res p  papir. Testen varer i cirka 15 min.

Inden unders gelsen

Andre tilstande end leversygdom kan ogs  p virke hjernen, s  fort l din l ge, hvis du har:

- Andre kroniske medicinske sygdomme.
- Tidligere haft blodprop eller bl dning i hjernen.
- Tager medicin, der p virker hjernefunktionen. Det kan v re visse typer antidepressiv medicin, epilepsimedicin, psykofarmaka og smertestillende medicin.

Det er vigtigt, at du p  testdagen er s  veludhvilet som muligt og ikke har indtaget alkohol.