

Valg af blodfortyndende medicin (AK-behandling)

Til patienter og pårørende

Marevan

Hvordan virker medicinen?

Hæmmer K-vitaminets virkning på dannelsen af stoffer i leveren, der igangsætter størkningsprocessen. Indtages som tabletter.

Antal tabletter dagligt

Variere fra patient til patient. Afhænger af individuel INR-værdi.

Erfaring med medicinen?

Præparatet er velkendt. Har været anvendt i ca. 50 år.

Blodprøvekontrol ved behandlingen

Kræver løbende blodprøvekontrol, hvor behandling justeres i forhold til INR-værdien. Som regel hver 2.-6. uge afhængig af patientens INR-værdi.

Hvis det skønnes af personalet, kan der være mulighed for oplæring af selvtest i hjemmet.

Modgift i forbindelse med akut operation eller blødning

I form af K-vitamin enten som tablet eller indsprøjtning. Virkningen indtræder i løbet af få timer. Det kan desuden gives størkningsstoffer i akutte situationer som indsprøjtning.

Bivirkninger

Øget tendens til blødninger. Færre blødninger i mavetarmkanalen i forhold til nogle DOAK.

Hvordan er patienten beskyttet ved glemt dosis?

Virningen af Marevan indtræder langsomt, men er i blodet i lang tid. Ved glemt døgndosis, er patienten derfor fortsat beskyttet mod blodpropper.

Kan sygdomme påvirke behandlingen?

Nogle sygdomme kan påvirke behandlingen med Marevan. Så det kan være behov for at tage blodprøver hyppigere end vanligt.

Kost og alkohols indvirkning

Kosten kan have betydning, hvis der indtages mange grønne grøntsager, da de indeholder K-vitamin, som virker modsat af Marevan.

1-2 genstande dagligt påvirker sjældent behandlingen.

Anden medicin, kosttilskud og naturlægemidlers indvirkning

Flere andre mediciner, nogle kosttilskud og naturlægemidler kan påvirke Marevanbehandlingen.

Prisen

Døgndosis er ca. 2-4 kr. (afhængig af daglig dosis).

Valg af blodfortyndende medicin (AK-behandling)

DOAK

Hvordan virker medicinen?

DOAK-præparater (Xarelto, Eliquis, Lixiana og Pradaxa) hæmmer forskellige størkningsstoffer i blodet, og nedsætter derved blodets størkningsevne. Indtages som tabletter.

Antal tabletter dagligt

1 eller 2 tabletter indtages fast dagligt afhængig af præparat.

Erfaring med medicinen

DOAK har været anvendt i mere end 10 år.

Blodprøvekontrol ved behandlingen

Blodfortyndende effekt kontrolleres ikke ved hjælp af blodprøver ligesom Marevan.

Dosis afhænger af nyre- og leverfunktionen. Nyre- og levertal kontrolleres inden opstart og efter 1 og 3 måneder. Herefter x 2 årligt. Hyppigere for udvalgte patienter.

Modgift i forbindelse med akut operation eller blødning

Findes for Pradaxa.

Ved behandling med Xarelto, Eliquis og Lixiana kan der gives størkningsstoffer som indsprøjtning.

Bivirkninger

Øget tendens til blødninger.

Forsigtighed især ved patienter, der har tendens til blødning i mavetarmkanalen.

Lidt færre alvorlige blødninger i hovedet i forhold til Marevan.

Hvordan er patienten beskyttet ved glemt dosis?

Virkning af DOAK indtræder hurtigt, men er også hurtigt ude af blodet igen. Ved glemt døgndosis er patienten dårligt beskyttet mod blodpropper.

Kan sygdomme påvirke behandlingen?

Ved svært nedsat lever- og nyrefunktion hos patienter med mekaniske hjerteklapper samt antifosfolipid syndrom, kan DOAK ikke anvendes.

Kost og alkohols indvirkning

Ingen betydning.

1-2 genstande dagligt påvirker sjældent behandlingen.

Anden medicin, kosttilskud og naturlægemidlers indvirkning

Nogle andre mediciner, kost- og naturlægemidler kan påvirke DOAK-behandlingen.

Pris

Døgndosis er ca. 10-24 kr.