

Bronkoscopi i fuld bedøvelse

Til patienter og pårørende

Hvad er bronkoscopi?

Bronkoscopi er en undersøgelse, hvor man med en tynd bøjelig kikkertslange (et bronkoskop) ser ned i lungernes luftrør (bronkier). Der kan her indsamles celle- og vævsprøver samt skylleprøver. Disse kan f.eks. anvendes til at undersøge for bakterier og svampe, samt en række andre lungesygdomme.

Forberedelse til undersøgelsen

Før undersøgelsen foretages en kort lægeundersøgelse og du skal snakke med en anæstesilæge omkring narkosen.

Der tages blodprøver, hjertekardiogram (EKG), evt. røntgenbillede af lungerne og en lungefunktionsundersøgelse.

Du bliver samtidig informeret om undersøgelsens karakter og evt. risici.

Du skal medbringe vanlig medicin også evt. alternative/naturpræparater.

På undersøgelsesdagen

- Du må ikke ryge i 8 timer før undersøgelsen.
- På undersøgelsesdagen skal du være fastende fra midnat. Du må dog drikke vand og saftvand (men ikke mælkeprodukter) indtil kl. 06:00.
- Medicinindtagelse: du skal tage al din vanlige medicin også inhalationsmedicin med mindre andet er aftalt.
- Neglelak og make-up må ikke anvendes på undersøgelsesdagen, idet det hindrer observation af hudfarven og dermed af kredsløbet. Smykker, piercinger m.v. efterlades hjemme.
- Du må ikke selv føre bil på undersøgelsesdagen.

Hvor foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foregår på Øre-Næse-Hals Afdelingens operationsafsnit.

Du skal dog møde i Lunge Ambulatorium (E3). Her vil du få udleveret patienttøj samt få et id-armbånd på.

Du vil her også tale med den læge, der skal foretage undersøgelsen, såvel før som efter undersøgelsen.

Du vil herefter blive hentet af en portør, som vil følge dig ned til operationsafsnittet. Her vil du få bedøvende medicin ind i din blodåre, som vil få dig til at sove.

Bronkoskopi i fuld bedøvelse

Selve undersøgelsen varer cirka 30 minutter, hvorefter du vil blive kørt tilbage til Lunge Ambulatoriet, hvor du vil blive observeret i to timer. I disse to timer må du ikke spise eller drikke. Efter de to timer, vil du blive tilbudt noget at drikke og spise. Hvis alt går fint, er du klar til at komme hjem.

Risici

Indgrebet medfører en lille risiko for, at man kan udvikle en punkteret lunge, som efterfølgende må drænbehandles. Herudover er der, såfremt der skal tages vævsprøver, en risiko for blødning. Begge risici er mulige at behandle.

Man kan efter indgrebet udvikle lungebetændelse, hvilket vil medføre antibiotisk behandling. Dette kræver sjældent indlæggelse.

Du kan hoste et par dage efter undersøgelsen, eventuelt med slim, som kan være let blodtilblandet. Derudover kan du også være hæs et par dage.

Svar på undersøgelsen

Inden du forlader Lunge Ambulatoriet, vil du få en tid til svar på undersøgelsen. Dette vil oftest være efter 1-2 uger. Du skal møde til svar i Lunge Ambulatorium.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, kan du kontakte Lunge Ambulatorium på telefon 7918 2671.