

Domperidon

Til patienter og pårørende

Domperidon findes som:

- Tabletter á 10 mg
- Stikpiller á 30 mg

Hvordan virker medicinen?

Domperidon har en kvalmeforebyggende og kvalmestillende virkning.

Domperidon tages på behandlingsdagen/dagene og efterfølgende ved behov.

Doseringsforslag

Tabletter:

1-2 tabletter (10-20 mg) 3-4 gange i døgnet eller efter behov.

Bemærk: maksimal dosis 80 mg. i døgnet.

Tabletterne tages 15-30 minutter før et måltid. Ved gener fra mave og tarm er det bedst at tage sidste dosis ved sengetid.

Tabletterne indtages med et glas vand.

Hvis tabletterne indtages sammen med mad, tager det længere tid før de virker.

Stikpiller:

1 stikpille (30 mg) 2 gange i døgnet.

Hvad er de mest almindelige bivirkninger ved medicinen?

Du vil kunne opleve rumlen i maven og let diarré, da Domperidon også virker fremmende på tømningen af mavesækken og øger tarmens funktion.

Hvis du på trods af behandling med Domperidon har kvalme, så tal med en sygeplejerske eller læge om det, da der ofte vil være mulighed for at ændre den kvalmestillende behandling.