

Operation af knuder på halsen

Til patienter og pårørende

Hvorfor operation af knuder på halsen?

Forstørrede lymfeknuder på halsen er relativt hyppigt og forsvinder oftest af sig selv. Der kan være mange årsager til at lymfeknuder bliver hævede. For at komme årsagen nærmere bliver der taget en række blodprøver og taget en nåleprøve fra den hævede lymfeknude for at undersøge denne under mikroskop.

Sjældent er dette ikke nok, og der anbefales at blive taget en større prøve fra lymfeknuden. Dette indgreb foregår i fuld bedøvelse, hvor der laves et snit på halsen, hvorfra prøven tages. Prøven, fra eller hele lymfeknuden, sendes så ind til yderligere vævsundersøgelse. Du får oftest mulighed for at komme hjem samme dag.

Operationen varer ca. 45 min. og foregår i fuld bedøvelse.

Sådan forbereder du dig til operation

Faste

Du skal møde fastende på operationsdagen.

Læs mere om fasteregler på www.svs.dk/fasteregler.

Bedøvelse

Læs mere om før du skal bedøves på www.svs.dk/bedøvelse.

Medicin

Hvad gør du med den medicin du får hjemmefra?

Læs mere om medicin på www.svs.dk/medicin.

Blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, kan der være særlige regler. Vær opmærksom på, at du har fået præcis besked, om netop den slags medicin du får.

Er du tvivl, skal du kontakte afdelingen.

Bad før operation

Læs mere om bad før operation på www.svs.dk/bad.

Rygning

For at fremme sårhelingen og minimere risiko for komplikationer anbefaler vi, at du stopper med at ryge 6 uger før din operation og vedholder rygestoppet efter operationen.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende rygning på www.sst.dk og søg efter publikationen "Rygning og operationer - forebyg komplikationer, når du skal opereres".

Operation af knuder på halsen

Find rygestopstilbud i din kommune på www.stoplinien.dk.

Vi gør opmærksom på, at Sydvestjysk Sygehus er røgfrit. Har du behov for at ryge, har sygehuset en rygepavillon.

Alkohol

Hvis du normalt drikker mere end 4 genstande om dagen, råder vi dig til at stoppe helt med at drikke alkohol mindst 4 uger før din operation.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkohol på www.sst.dk og søg efter publikationen "Alkohol og operationer - forebyg komplikationer, når du skal opereres".

Vi er i Øre, Næse og Halskirurgisk Ambulatorium opmærksom på, at din operationsdato evt. ligger tidligere, og at anbefalingerne derfor kan være svære at efterleve. Vi anbefaler, at så snart du kender datoen for din operation, stopper med at ryge og drikke.

Er der ventetid?

Der er mange aktiviteter i gang på samme tid på en afdeling, og der kan derfor forekomme ventetid. Ventetiden kan for eksempel skyldes situationer med akut dårlige patienter.

Det er en god idé, at medbringe læsestof. Så virker ventetiden knap så lang.

Hvordan forholder jeg mig efter operationen?

Når du kommer tilbage fra operationen, må du være oppegående.

I forbindelse med operationen lægger lægen muligvis et dræn. Det er en lille plastslange, der skal lede blod og væske fra operationsområdet. Drænet fjernes dagen efter operationen.

Smerter og medicin

Efter en operation kan du ofte have behov for smertestillende medicin. Vi anbefaler, at du sørger for at købe håndkøbsmedicin som f.eks. Pinex, Panodil eller Pamol til, når du udskrives. Husk at læse indlægssedlen.

Nogle patienter har brug for stærkere medicin, hvis det er tilfældet, vil du få besked, når du bliver indlagt.

Med god smertelindring kan eventuel genoptræning hurtigere begynde.

Kost

Efter operationen må du spise og drikke efter eget ønske.

Udskrivelse sådan forholder du dig

Inden vi udskriver dig, kommer du til at tale med en læge.

Du får information om forholdsregler af sundhedspersonalet.

Ambulant kontrol

Du får en tid med hjem til kontrol

- 1 uge efter operationen
- 2 uger efter operationen, hvor du får svar på prøverne. Lægen vurderer resultatet af operationen.

Sygemelding

Du skal være sygemeldt i 1 uge.

Du bør undgå hårdt fysisk arbejde i 3 uger.

Operation af knuder på halsen

Vandladning

Hvis du ikke kan komme af med vandet, skal du kontakte sygehuset for at undgå varige vandladningsgener. Læs mere om manglende vandladning (Postoperativt urinretention) på <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/nyrer-og-urinveje/sygdomme/andre-urinvejssygdomme/postoperativ-urinretention/>.

Forstoppelse

Det er vigtigt, at du inden for få dage får gang i maven efter en operation. Ved forstoppelse skal du tage kontakt til egen læge. Læs mere om forstoppelse på <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/mave-og-tarm/sygdomme/tyktarm/forstoppelse/>.

Komplikationer

Blødning

Der kan efter operationen komme blødning og hævelse på halsen. Hvis der er blødning og/eller meget hævelse, skal du kontakte den afdeling, du er udskrevet fra.

Betændelse

Hvis der opstår betændelse, skal du kontakte din egen læge eller vagtlægen.

Tegn på betændelse:

- Rødme omkring såret
- Feber
- Udtalt hævelse
- Tiltagende smerter/ømhed.

Nervepåvirkning

Ved operationen kan nerverne i sjældne tilfælde blive påvirket.

Smerter, kløe, irritation

Op til 3 måneder efter operationen kan du have lette smerter, kløe og irritation på halsen.

Gode råd

Du skal være opmærksom på, at sol kan have en dårlig virkning på arrets udseende. Vi anbefaler derfor, at du anvender solcreme factor 30 det første halve år.

Hjemtransport

Som udgangspunkt skal alle patienter selv sørge for transport og selv betale kørselsudgifterne. Der er dog nogle få undtagelser. Læs om Sydvestjysk Sygehus' Transport og befordringsgodtgørelse på www.svs.dk/transport.

Du må ikke føre et køretøj (bil, motorcykel eller lignende), hvis:

- Du har været bedøvet eller fået afslappende medicin. Gælder frem til næste morgen.
- Du mangler kontrol over arm eller ben. Gælder til du har fuld førlighed igen.

Med venlig hilsen

Personalet

Øre-Næse-Halsafdelingen