

Pacemaker-skift

Til patienter og pårørende

Hjertesygdomme

Pacemakerskift

Du er indkaldt til skift af din pacemaker og hermed følger nogle oplysninger omkring forberedelsen hertil.

Før operationsdagen

- Det er vigtigt, at du 3 dage før operationen holder pause med blodfortyndende medicin dvs. Marevan eller Marcoumar.
- Hvis du får Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis skal du ophøre med medicinen dagen før operationen.
- Alt andet vanligt medicin skal du tage som normalt.
- Hvis du er klapopereret, bedes du kontakte Pacemakerambulatoriet.
- Bemærk at du ikke selv må køre bil efter operationen, planlæg derfor inden dagen, hvordan du kommer hjem.

På operationsdagen

- Du møder på Ambulatorium for Hjertesygdomme, hvor der gives information om forløbet af pacemakersygeplejersken. Der kan forekomme ventetid.
- Hårene i det område på brystet, hvor pacemakere sidder, barberes af af sygeplejersken.
- Der lægges en lille plastikkanyle i en blodåre i den ene hånd, og for at forebygge betændelse, gives der antibiotika i den ca. 1 time før operationen.

Pacemaker-skift

Selve operationen

Selve operationen foregår på Røntgenafdelingen, hvor der er forskelligt overvågningsudstyr.

Der vil hele tiden være en læge og sygeplejerske til stede, som kan forklare, hvad der foregår og svare på spørgsmål.

Huden renses med sprit, og derefter lægges steril afdækning omkring operationsområdet, for at holde det rent. Herefter lokalbedøves i området, således at indgrebet ikke gør ondt.

Skulle der alligevel komme smerter undervejs, er det muligt at få ekstra smertestillende medicin gennem plastikkanylen i hånden.

Der laves et snit i det gamle ar. Pacemakere tages op og skrues af ledningerne, og herefter sættes en ny pacemaker til de eksisterende ledninger. Den nye pacemaker anbringes under huden, der herefter syes sammen og påsættes forbindelse.

Efter operationen

Efter ca. 4 timer må du stå op, og kan formentlig umiddelbart herefter udskrives. Du må ikke selv køre hjem.

Risiko ved operationen

Blødning fra operationssåret kan forekomme og give anledning til mindre blodansamling under huden, dette forsvinder af sig selv efter et par uger.

Når du kommer hjem

- Trådene, såret er syet med, forsvinder af sig selv efter ca. 3 uger.
- Du skal være opmærksom på såret. Bliver det rødt eller væskende, skal du henvende dig til Pacemakerambulatoriet.
- Du må ikke køre bil før efter en uge.
- Du må gå i bad på 2. dagen efter operationen.

Pacemaker-skift

- Du får et

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Pacemakerambulatoriet og tale med en sygeplejerske. De kontaktes på telefon 7918 3138 alle hverdage mellem kl. 8-8.30.

Kontakt

Pacemakerambulatoriet ligger i forbindelse med Ambulatorium for Hjertesygdomme

Sydvestjysk Sygehus

Finsensgade 35

6700 Esbjerg

Bygning E, etage 2 (følg Hovedstrøg til E. Tag elevator eller trappe til E2)