

Forholdsregler ved forhøjede nyretal - KAG

Til patienter og pårørende

Af hensyn til din nyrefunktion skal du holde pause med følgende medicin dagen før og samme dag som KAG:

Medicinen må genoptages dagen efter KAG i sædvanlig dosis.

Ligeledes af hensyn til din nyrefunktion, er det vigtigt, at du indtager rigeligt med væske om eftermiddagen og aftenen før KAG, det vil sige mindst 1,5 L væske (vand, the, saft osv.). Dette er for at hjælpe nyrerne med at udskille røntgenkontrastvæsken efter KAG.

Samtidig skal du tage brusetablet Mucolysin for at beskytte nyrerne mod eventuelle bivirkninger til kontrastvæsken. Brusetablet Mucolysin á 200 mg indtages på følgende måde:

- 1200 mg (= 6 stk.) Mucolysin morgen og aften dagen før undersøgelsen
- 1200 mg (= 6 stk.) Mucolysin morgen og aften på KAG-dagen

De 6 brusetabletter opløses i et glas vand og drikkes.

Du skal 3 dage efter undersøgelsen have taget en blodprøve (nyretal).

Hvis du ikke hører nærmere, er det fordi tallet ikke er blevet yderligere påvirket af undersøgelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Hjerter Ambulatoriet på telefon 7918 2695.