

Undersøgelse af livmoderhalsens slimhinde for celleforandringer

Ved mistanke om celleforandringer vil der blive foretaget en kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi).

I forbindelse med den gynækologiske undersøgelse vil lægen se på livmoderhalsen under forstørrelse gennem en kikkert.

Der føres de almindelige instrumenter til en gynækologisk undersøgelse op i skeden - kikkerten skal ikke op i skeden.

Lægen vil se, om der er forandringer i slimhinden på livmoderhalsen.

Derefter tages små vævsprøver (biopsier) af livmoderhalsen.

Der tages også nogle celler fra livmoderhalskanalen, som er den nederste del af livmoderen, der udmunder i toppen af skeden.

Smertestillende

Nogle synes, at vævsprøverne er lidt ubehagelige, og det kan give menstruationslignede smerter.

Det bedste du kan gøre, er at slappe af så godt som muligt og ikke spænde, da det gør ubehaget værre.

Du kan eventuelt tage 2 tabletter Kodimagnyl, Paracetamol eller Pinex, inden du kommer til Ambulatorium for Kvindesygdomme.

Blødning

Der kan komme blødning fra skeden i de første dage efter biopsierne.

I nogle tilfælde vil lægen lægge et stykke gaze (en meche) op i skeden i forbindelse med biopsierne.

Du skal selv fjerne mechen cirka 4 timer efter undersøgelsen.

Du skal ikke være bange for at trække mechen ud, den sidder ikke fast i noget - men kan virke lang.

Du opfordres til at tage den med ro resten af dagen, når der er taget biopsier.

På grund af blødnings- og infektionsrisiko skal du i de næste 7 dage undgå

- Karbad, havbad og svømmehal
- Tampon
- Samleje

Ved problemer det første døgn, kontaktes sygeplejersken på Fælles Akutmodtagelsen (FAM) på telefon 7918 2132

Hvis der udover det første døgn er vedvarende kraftig blødning eller tegn på infektion i form af underlivssmerter og feber, bør du tage kontakt til egen læge eller vagtlæge.

Med venlig hilsen
Personalet