

Operation for forsnævring i urinrøret (Sachse)

Til patienter og pårørende

Årsager til urinrørsforsnævring

Urinrørsforsnævring kan opstå som følge af behandling, kateteranlæggelse eller som komplikationer til fx operationer, der foregår gennem urinrøret.

Derudover kan urinrørsforsnævninger opstå som følge af mekaniske skader (traumer) mod urinrøret, og endelig som komplikation til betændelse i urinrøret.

Enkelte tilfælde skyldes kræft i urinrøret, der er en meget sjælden kræftform.

Fælles for de erhvervede urinrørsforsnævninger er, at de opstår pga. et brud på slimhinden i urinrøret. Dette fører til irritation og betændelse omkring urinrøret, hvorefter ophelingen medfører en forsnævring pga. arvæv.

Operation for urinrørsforsnævring

Forsnævringen ophæves ved at der føres et kikkertinstrument (cystoskop) op igennem urinrøret. Herigennem bliver forsnævringen gennemskåret, så der igen bliver skabt passage i urinrøret. Operationen foregår i fuld bedøvelse.

Under operationen bliver der lagt et kateter op i blæren.

Det skal forhindre, at den forsnævring, som netop er blevet skåret igennem, vokser sammen igen. Det er individuelt, hvor længe kateteret skal ligge.

Før operationen

Er du i behandling med blodfortyndende medicin, skal du aftale med lægen, om du skal holde pause med det inden operationen.

Efter operationen

Du skal efter operationen være opmærksom på følgende symptomer:

Feber, hyppig vandladning, svie under vandladningen og manglende vandladning. Dette kan være tegn på blærebetændelse.

Operation for forsnævring i urinrøret (Sachse)

Kontrol

I forbindelse med udskrivelsen vil der foregå en orientering om fjernelse af kateteret, videre kontrol og behandling.

Sygemelding

Der er sjældent behov for sygemelding

Udvidelse af urinrøret

Det kan i visse tilfælde være begrundet at udføre udvidelse af urinrøret efter operationen ved hjælp af specielle katetre.

I så fald udføres instruktionen i proceduren i ambulatoriet efter operationen.