

Behandling af overaktiv blære med Botox

Til patienter og pårørende

Virkemåde

Botox virker ved at forårsage en delvis lammelse af blærens muskulatur. Virkningen varierer fra patient til patient. I de fleste tilfælde holder virkningen sig i 3-9 måneder.

Hvordan foregår indgrebet?

Indgrebet varer ca en halv time og foretages i lokal bedøvelse eller fuld bedøvelse. Lægen foretager først en kikkertundersøgelse af blæren via urinrøret. Derefter sprøjtes Botox jævnt fordelt ind i blærevæggen.

Er der nogen forberedelser?

Du skal medbringe en morgenurinprøve, som vi undersøger for bakterier. Skal opbevares køligt. Har du symptomer på blærebetændelse skal du gå til egen læge og få undersøgt urinen inden undersøgelsen.

Er der ventetid?

Der er mange aktiviteter i gang på samme tid på en afdeling og der kan derfor forekomme ventetid. Ventetiden kan fx skyldes situationer med akut dårlige patienter. Det er en god ide at medbringe læsestof, så virker ventetiden knap så lang.

Efter indgrebet

Hvis du har været i fuld bedøvelse

Efter operationen kommer du på opvågningsstuen til observation. Du skal blive der 1-2 timer eller til det vurderes at du er klar til at komme hjem, efter du har været i bedøvelse.

Hvis du har været i lokalbedøvelse

Du kan tage hjem umiddelbart efter indgrebet er afsluttet, idet du udelukkende har været lokal bedøvet.

Forventet effekt indtræder forskelligt fra patient til patient. Nogle oplever en forværring af symptomerne umiddelbart efter Botoxindsprøjtningen, andre har effekt med det samme.

Det er normalt at have lidt blod i urinen og let svie ved vandladningen efter behandlingen.

Du kan have lette smerter i blæren de første dage, hvorfor vi anbefaler dig at tage smertestillende håndkøbsmedicin, f.eks. 2 tablet Pamol à 500 mg max 4 gange i døgnet indtil smerterne aftager.

Behandling af overaktiv blære med Botox

Der er ingen forholdsregler i forhold til fysisk aktivitet efter indgrebet.

Du skal søge læge ved tegn på blærebetændelse i form af hyppig vandladning, smerte ved vandladning, ildelugtende urin eller feber.

Du skal ligeledes søge læge hvis du får besvær med at lade vandet.

Hvad gør jeg ved aftagende virkning? Når du fornemmer at virkningen aftager, kan du kontakte os pr telefon 7918 2316 tryk 1 (8.30 - 12) - torsdag kl 9-12 med henblik på at aftale/bestille ny tid.