

Medicinsk behandling med Flecainid

Til patienter og pårørende

Afdeling for Hjertesygdomme

Flecainid er et lægemiddel, som bruges til at forebygge og behandle hjerterytmeforstyrrelser i hjertets forkamre.

Behandlingen foregår under indlæggelse

Grundet risiko for rytmeforstyrrelser under behandlingen, vil behandlingen foregå på Sengeafsnit for Hjertesygdomme E2, Esbjerg Sygehus.

Under behandlingen

Under behandlingen overvåger vi din hjerterytme i 2 døgn. Herudover vil der dagligt blive taget blodprøver, og du vil få lavet 2 hjertediagrammer dagligt. Under indlæggelsen vil du få anlagt et drop i en blodåre i armen, som skal bruges til medicin ved behov for korrigerende af hjerterytmen.

Dosering

Din dosis vil bestå af enten 50mg eller 100 mg, 2 gange dagligt.

Medicinens virkning

Behandlingen med Flecainid er et såkaldt 1C anti-arytmika. Det virker kraftigt stabiliserende på hjerterytmen og bliver ofte kombineret med Selo-zok eller Digoxin. Medicinen er receptpligtig og kan kun udskrives af en læge.

Bivirkninger

Det er forskelligt fra person til person for hvilke bivirkninger, der opleves.

De hyppigste bivirkninger er:

Lav puls

Hovedpine

Svimmelhed

Synsproblemer

Træthed

Medicinsk behandling med Flecainid

Kontrol

Kontrol efter opstart af behandlingen foregår på Hjertemedicinsk ambulatorium Esbjerg efter 1 måned, igen efter 3 måneder og igen efter 6 måneder. Herefter bliver du indkaldt hver 6. måned.

Forinden kontroltiden skal du have taget blodprøver og et kontrol hjertediagram/EKG. Derefter kommer du til at snakke med en sygeplejerske om, hvordan det går med hjerterytmen.

Du vil modtage en indkaldelse i din digitale post.

Kontakt

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Hjerte Ambulatoriet på telefon 7918 2695.